

En caso de brote en Sala Cuna o Jardín Infantil:

Informe a los padres y a los miembros del personal.
Asegúrese que todos los niños y adultos se laven las manos
adecuadamente.

Ante cualquier duda o consulta :
epinuble@redsalud.gob.cl
Fono: **422585282/ 422585279**

Enfermedad De Escabiosis (Comúnmente conocida como Sarna)



Unidad de Epidemiología
Seremi de Salud, Ñuble.

¿Qué es?

Es una **dermatosis parasitaria** producida por un ácaro que se asocia a lesiones en la piel. **Comúnmente conocida como sarna.**

¿Cuáles son sus síntomas?

Enfermedad que **causa intenso picor/rasquido**, comienza de forma paulatina y va aumentando en el tiempo. **Es de mayor intensidad en la noche al acostarse**, incluso puede afectar el sueño (descanso), pero también puede producir prurito (picazón) durante el día. **Puede presentarse en todo el cuerpo** desde el cuello a los pies más común en zonas de pliegues: entre los dedos, axila, muñeca, cara interna de los brazos, antebrazos, región genital, cara interna de los muslos, rodillas y tobillos. **Debido al intenso picor se producen lesiones por rascado con costras.**

¿Quién se contagia y cómo?

Esta enfermedad se transmite fácilmente **por contacto directo con persona infectada** y además al tener contacto con utensilios personales (toalla, sábanas, ropa, etc).

¿Cómo se puede prevenir el contagio?

- Higiene personal diaria
- Lavado de vestimentas, toallas y ropa de cama con agua caliente o dejando remojar las ropas por 30 min antes del lavado. Lo que no se pueda lavar, se plancha.
- Evitar situaciones que favorecen el contacto físico directo (compartir cama).
- Mantener las uñas cortas y limpias.
- Los objetos juguetes, útiles escolares de uso común, que no puedan ser lavados deben ser desinfectados.

Prevención y control en establecimiento

- Importante cumplir con tratamiento y reposo indicado por médico.
- Evite contacto directo con persona que cursa con la enfermedad.
- Lavado frecuente de manos con abundante agua y jabón.
- Desinfectar con frecuencia las superficies de alto tránsito o uso (mesa, juguetes, manijas de las puertas, etc.). Para esto, limpiar con solución jabonosa y luego desinfectar con solución de agua clorada al 0,5 %.
- Ventilar los espacios.
- Evitar ocupar vestimentas, toalla, ropa de cama de una persona infectada.
- Es importante cumplir con la indicación médica, dado que es favorable para evitar propagación de la enfermedad y la recuperación pronta del afectado.